arXiv:1303.1799v1 [math.CV] 7 Mar 2013

УДК 517.5

**Салимов Р.Р.** (Ин-т прикладной математики и механики НАН Украины, Донецк)

# Гельдеровость кольцевых $Q$-гомеоморфизмов относительно $p$-модуля

Найдено достаточное условие гельдеровости кольцевых $Q$-гомеоморфизмов в $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, относительно $p$-модуля при $n-1<p<n$.

It is founded the sufficient condition of Holder continuity of the ring $Q$-homeomorphisms in $\mathbb{R}^n, n \geq 2$ with respect to $p$-modulus at $n-1<p<n$.

**1. Введение.** Напомним некоторые определения. Борелева функция $\varrho : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ называется *допустимой* для семейства кривых $\Gamma$ в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, пишут $\varrho \in \operatorname{adm} \Gamma$, если

$$\int\limits_{\gamma} \varrho(x)\, ds(x) \geqslant 1$$

для всех $\gamma \in \Gamma$. Пусть $p \geqslant 1$. Тогда *$p$-модулем* семейства кривых $\Gamma$ называется величина

$$M_p(\Gamma) = \inf_{\varrho \in \operatorname{adm} \Gamma} \int\limits_{\mathbb{R}^n} \varrho^p(x)\, dm(x).$$

Здесь $m$ обозначает меру Лебега в $\mathbb{R}^n$.

Пусть $G$ – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$. Предположим, что $n-1<p<n$ и

$$M_p(f\Gamma) \leq K\, M_p(\Gamma) \qquad (1)$$

для произвольного семейства $\Gamma$ кривых $\gamma$ в области $G$. При предположении, что $f$ в (1) является гомеоморфизмом, Герингом было установлено, что отображение $f$ является *липшицевым*, другими словами, при некоторой постоянной $C>0$ и всех $x_0 \in G$ справедлива оценка

$$\limsup_{x \to x_0} \frac{|f(x)-f(x_0)|}{|x-x_0|} \leqslant C,$$

см., напр., теорему 2 в [1].

**2. О кольцевых $Q$-гомеоморфизмах относительно $p$-модуля.** Всюду далее $B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x-x_0| < r\}$, $\mathbb{B}^n = B(0,1)$, $\omega_{n-1}$ –

площадь единичной сферы $\mathbb{S}^{n-1}$ в $\mathbb{R}^n$. Пусть $Q : G \to [0,\infty]$ – измеримая функция. Для любого измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^n$ и числа $r > 0$ обозначим

$$\fint\limits_{E} Q(x)\,dm(x) = \frac{1}{m(E)}\int\limits_{E} Q(x)\,dm(x)\,,$$

$$q_{x_0}(r) = \frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}}\int\limits_{S(x_0,r)} Q(x)d\mathcal{A}(x)\,,$$

где $S(x_0,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| = r\}$, а $d\mathcal{A}(x)$ – элемент площади поверхности.

Напомним следующие термины. Пусть $E\,,F \subseteq \mathbb{R}^n$ – произвольные множества. Обозначим через $\Delta(E,F;G)$ семейство всех кривых $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$, которые соединяют $E$ и $F$ в $G$, т.е. $\gamma(a) \in E\,, \gamma(b) \in F$ и $\gamma(t) \in G$ при $a < t < b$. Пусть $x_0 \in G$, $d_0 = dist(x_0\,,\partial G)$ и $Q : G \to [0\,,\infty]$ – измеримая по Лебегу функция. Для любых $r_1$ и $r_2$, где $0 < r_1 < r_2 < \infty$, обозначим

$$R(x_0,r_1,r_2) = \{x \in \mathbb{R}^n : r_1 < |x - x_0| < r_2\},$$

$$S_{r_i} = S(x_0,r_i)\,, \quad i = 1,2.$$

Будем говорить, что гомеоморфизм $f : G \to \mathbb{R}^n$ является *кольцевым $Q$-гомеоморфизмом относительно $p$-модуля в точке* $x_0 \in G$, $1 < p \le n$, если соотношение

$$M_p\left(\Delta\left(fS_{r_1}, fS_{r_2}; fG\right)\right) \le \int\limits_{R(x_0,r_1,r_2)} Q(x)\cdot\eta^p(|x - x_0|)\,dm(x) \qquad (2)$$

выполнено для любого кольца $R(x_0,r_1,r_2)$, $0 < r_1 < r_2 < d_0$ и для каждой измеримой функции $\eta : (r_1,r_2) \to [0,\infty]$, такой, что

$$\int\limits_{r_1}^{r_2} \eta(r)\,dr \ \ge\ 1\,.$$

Говорят, что гомеоморфизм $f : G \to \mathbb{R}^n$ является *кольцевым $Q$-гомеоморфизмом относительно $p$-модуля в области* $G$, если условие (2) выполнено для всех точек $x_0 \in G$.

Развиваемая в работе теория кольцевых $Q$-гомеоморфизмов относительно $p$-модуля применима, в частности, к отображениям квазиконформным в среднем, см. [5].

**3. Предварительные замечания.** Следуя работе [6], пару $\mathcal{E} = (A, C)$, где $A \subset \mathbb{R}^n$ – открытое множество и $C$ – непустое компактное множество, содержащееся в $A$, называем *конденсатором.* Конденсатор $\mathcal{E}$ называется *кольцевым конденсатором*, если $B = A \setminus C$ – кольцо, т.е., если $B$ – область, дополнение которой $\overline{\mathbb{R}^n} \setminus B$ состоит в точности из двух компонент. Говорят также, что конденсатор $\mathcal{E} = (A, C)$ лежит в области $G$, если $A \subset G$. Очевидно, что если $f : G \to \mathbb{R}^n$ – непрерывное, открытое отображение и $\mathcal{E} = (A, C)$ – конденсатор в $G$, то $(fA, fC)$ также конденсатор в $fG$. Далее $f\mathcal{E} = (fA, fC)$.

Функция $u : A \to \mathbb{R}$ *абсолютно непрерывна на прямой*, имеющей непустое пересечение с $A$, если она абсолютно непрерывна на любом отрезке этой прямой, заключенном в $A$. Функция $u : A \to \mathbb{R}$ принадлежит классу ACL (*абсолютно непрерывна на почти всех прямых*), если она абсолютно непрерывна на почти всех прямых, параллельных любой координатной оси.

Обозначим через $C_0(A)$ множество непрерывных функций $u : A \to \mathbb{R}^1$ с компактным носителем, $W_0(\mathcal{E}) = W_0(A, C)$ – семейство неотрицательных функций $u : A \to \mathbb{R}^1$ таких, что 1) $u \in C_0(A)$, 2) $u(x) \geqslant 1$ для $x \in C$ и 3) $u$ принадлежит классу ACL. Также обозначим

$$|\nabla u| = \left( \sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^2 \right)^{1/2}.$$

При $p \geqslant 1$ величину

$$\mathrm{cap}_{\mathrm{p}}\, \mathcal{E} = \mathrm{cap}_{\mathrm{p}}\, (A, C) = \inf_{u \in W_0(\mathcal{E})} \int\limits_A |\nabla u|^p \, dm(x)$$

называют *p-ёмкостью* конденсатора $\mathcal{E}$. В дальнейшем при $p > 1$ мы будем использовать равенство

$$\mathrm{cap}_{\mathrm{p}}\, \mathcal{E} = M_p(\Delta(\partial A, \partial C; A \setminus C)), \tag{3}$$

см. [7], [8] и [9].

Известно, что при $1 \leq p < n$

$$\mathrm{cap_p}\,\mathcal{E} \geqslant n\nu_n^{\frac{p}{n}}\left(\frac{n-p}{p-1}\right)^{p-1}\left[m(C)\right]^{\frac{n-p}{n}} \tag{4}$$

где $\nu_n$ - объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$, см., напр., неравенство (8.9) в [10].

При $n-1 < p \leq n$ имеет место оценка

$$\left(\mathrm{cap_p}\ \mathcal{E}\right)^{n-1} \geq \gamma\,\frac{d(C)^p}{m(A)^{1-n+p}}\ , \tag{5}$$

где $d(C)$ - диаметр компакта $C$, $\gamma$ - положительная константа, зависящая только от размерности $n$ и $p$, см. предложение 6 в [11].

## 4. Гёльдеровость кольцевых $Q$-гомеоморфизмов относительно $p$-модуля.

Ниже приведена теорема о достаточном условии гёльдеровости кольцевых $Q$-гомеоморфизмов относительно $p$-модуля при $n-1 < p < n.$

**Теорема.** *Пусть $G$ и $G'$ – области в $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 2$, $f : G \to G'$ – кольцевой $Q$-гомеоморфизм относительно $p$-модуля $(n-1 < p < n)$ с $Q(x) \in L_\alpha(G)$, $\alpha > \frac{n}{n-p}$ и $F \subset G$ – произвольный компкт. Тогда*

$$|f(x)-f(y)| \leq \lambda_{n,p}\|Q\|_{\alpha}^{\frac{1}{n-p}}|x-y|^{1-\frac{n}{\alpha(n-p)}}, \tag{6}$$

*для любой пары точек $x, y \in F$, удовлетворяющих условию $|x-y| < \delta$, где $\delta = \frac{1}{4}dist(F, \partial G)$ и $\|Q\|_\alpha = \left(\int\limits_G Q^\alpha(x)\,dm(x)\right)^{\frac{1}{\alpha}}$ – норма в пространстве $L_\alpha(G)$, $\lambda_{n,p}$ - положительная постоянная, зависящая только от $n$ и $p$.*

*Доказательство.* Рассмотрим сферическое кольцо $R = R(x, \varepsilon_1, \varepsilon_2)$ с $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \delta$ такое, что $R(x, \varepsilon_1, \varepsilon_2) \subset G$. Тогда $\left(fB\left(x, \varepsilon_2\right), \overline{fB\left(x, \varepsilon_1\right)}\right)$ – кольцевой конденсатор в $G'$ и, согласно (3), имеем равенство

$$\mathrm{cap_p}\ (fB(x,\varepsilon_2), \overline{fB(x,\varepsilon_1)}) = M_p(\triangle(\partial fB(x,\varepsilon_2), \partial fB(x,\varepsilon_1); fR))$$

а ввиду гомеоморфности $f$, равенство

$$\triangle\left(\partial fB\left(x,\varepsilon_2\right), \partial fB\left(x,\varepsilon_1\right); fR\right) = f\left(\triangle\left(\partial B(x,\varepsilon_2), \partial B(x,\varepsilon_1); R\right)\right).$$

Рассмотрим функцию

$$\eta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_2-\varepsilon_1}, & t \in (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \\ 0, & t \in \mathbb{R} \setminus (\varepsilon_1, \varepsilon_2). \end{cases}$$

В силу определения кольцевого $Q$-гомеоморфизма относительно $p$-модуля, замечаем, что

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,\varepsilon_2),\overline{fB(x,\varepsilon_1)})\le\frac{1}{(\varepsilon_2-\varepsilon_1)^p}\int\limits_{R(x,\varepsilon_1,\varepsilon_2)}Q(x)\,dm(x)\;. \tag{7}$$

Применяя неравенство Гельдера, имеем

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,\varepsilon_2),\overline{fB(x,\varepsilon_1)})\le\frac{(\Omega_n\varepsilon_2^n)^{\frac{\alpha-1}{\alpha}}}{(\varepsilon_2-\varepsilon_1)^p}\|Q\|_{\alpha}. \tag{8}$$

Далее, выбирая $\varepsilon=|x-y|$, $\varepsilon_1=2\varepsilon$ и $\varepsilon_2=4\varepsilon$, получим

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,4\varepsilon),f\overline{B(x,2\varepsilon)})\le\;\gamma_1\|Q\|_{\alpha}\cdot\varepsilon^{\frac{\alpha n-\alpha p-n}{\alpha}}\;. \tag{9}$$

С другой стороны, в силу неравенства (4) вытекает оценка

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,4\varepsilon),f\overline{B(x,2\varepsilon)})\ge\gamma_2\left[m(fB(x,2\varepsilon))\right]^{\frac{n-p}{n}}\;, \tag{10}$$

где $\gamma_2$ – положительная константа, зависящая только от размерности пространства $n$ и $p$.

Комбинируя (9) и (10), получаем, что

$$m(fB(x,2\varepsilon))\leqslant\gamma_3\|Q\|_{\alpha}^{\frac{n}{n-p}}\varepsilon^{\frac{n(\alpha n-\alpha p-n)}{\alpha(n-p)}}\;, \tag{11}$$

где $\gamma_3$ - положительная постоянная зависящая только от $n$ и $p$.

Далее, выбирая в (8) $\varepsilon_1=\varepsilon$ и $\varepsilon_2=2\varepsilon$, получим

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,2\varepsilon),f\overline{B(x,\varepsilon)})\le\;\gamma_4\|Q\|_{\alpha}\cdot\varepsilon^{\frac{\alpha n-\alpha p-n}{\alpha}}\;. \tag{12}$$

С другой стороны, в силу неравенства (5), получаем

$$\operatorname{cap}_{\mathrm{p}}\,(fB(x,2\varepsilon),f\overline{B(x,\varepsilon)})\ge\left(\gamma_5\frac{d^p(\overline{fB(x,\varepsilon)})}{m^{1-n+p}(fB(x,2\varepsilon))}\right)^{\frac{1}{n-1}}\;, \tag{13}$$

где $\gamma_5$ – положительная константа, зависящая только от $n$ и $p$.

Комбинируя (12) и (13), получаем, что

$$d(\overline{fB(x,\varepsilon)})\le\gamma\|Q\|_{\alpha}^{\frac{1}{n-p}}\varepsilon^{1-\frac{n}{\alpha(n-p)}}\;.$$

где $\gamma$ – положительная константа, зависящая только от $n$ и $p$. Оценка (6) получается отсюда и из очевидного неравенства $d(\overline{fB(x,\varepsilon)})\ge|f(x)-f(y)|$.

## Список литературы

[1] *Gehring F.W.* Lipschitz mappings and the $p$-capacity of ring in $n$-space // Advances in the theory of Riemann surfaces (Proc. Conf. Stonybrook, N.Y., 1969), Ann. of Math. Studies. – 1971. – **66**. – P. 175–193.

[2] *Сакс С.* Теория интеграла, – М., ИЛ, 1949.

[3] *Салимов Р.Р.* Об оценке меры образа шара // Сиб. матем. ж. - 2012. - Т.53, № 6, с. 920-930.

[4] *Салимов Р.Р.* Локальное поведение обобщенных квазиизометрий // Доповиди НАНУ.- 2011, №6, с. 23 – 28.

[5] *Golberg A.* Integrally quasiconformal mappings in space // Збiрник праць Iн-ту математики НАН України. Т.7, N2, 2010, с. 53-64

[6] *Martio O., Rickman S., Vaisala J.* Definitions for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A1. Math. – 1969. – **448**. – P. 1-40.

[7] *Gehring F.W.* Quasiconformal mappings in Complex Analysis and its Applications, V. 2, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1976.

[8] *Hesse J.* A $p$-extremal length and $p$-capacity equality // Arc. Mat. – 1975. – **13**. – P. 131-144.

[9] *Shlyk V.A.* On the equality between $p$-capacity and $p$-modulus // Sibirsk. Mat. Zh. – 1993. – **34**, no. 6. – 216-221.

[10] V. Maz'ya, *Lectures on isoperimetric and isocapacitary inequalities in the theory of Sobolev spaces.* Contemp. Math., **338** (2003), 307—340.

[11] *Кругликов В.И.* Ёмкости конденсаторов и пространственные отображения, квазиконформные в среднем // Матем. сб. – 1986. – **130**, № 2. – С. 185-206.

[12] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Moduli in Modern Mapping Theory. Springer Monographs in Mathematies: – New York: Springer, 2009, 367 p.

Салимов Руслан Радикович

Институт прикладной математики и механики НАН Украины
ул. Розы Люксембург 74, Донецк, 83114.
Рабочий телефон: 311-01-45
Email: salimov07@rambler.ru, ruslan623@yandex.ru,